

(Eriosoma

په منوکی پخته گک چی دی اقبیلینوس په واسطه اخته شوی وی



د اقبیلینوس مچی



دمچی دخروج سوری



هغه موم چی دی تارویه شکل په پخته گک تشریح شوی وی

د پخته گک کورنی دشاخ په داغ کی له غخیدوروسنه



**توضیحات :** داسپیری دتارونوپه مشکل دی موم په واسطه پوښ شوی دی. ځوانه حشره ژمی په دی مری څانګه په پوستکی کی اوپاریشه کی تیروی. اوپه پسرلی کی بنځینه بچی زیروی. کله چی اخته کیدل ډیره شدیدیه وی نوکورتی په شین رنگ ښکاری. ځوانی سپیری اوبچی بی دلرگی اوناژکوبشاخونوغذایی موادیی زبیینی خوپانی ددی هدف لپاره نه کاروی. کله چی زهری موادپچکاری کری دتباکوپه شکل داغونه پزیردی اومری. وزرلرونکی سپیری دی سرطان په میاشت کی ظاهریری ترڅوچه نوی کورنی چوری کری.

پخته ګګ له لاندی اوپاریشی څخه انتشارکوی نودی معاینه له خاطره وروسته له شګوفی څخه ورو ترتیبات ونیسی اوطبیعی دښمن هم معاینه کری. تورمحکمه مومیایی شوی ځوانی ښپیری له دایروی سوری څخه له سپیری څخه راووزی.

د مبارزی شروع هغه وخت کیږی چه ۴ فیصده دنوپه نویوشاخونوکی پیداشی.

**مخنیوی :-** داحشره په امیداکلوپ ریډ نه کنټرولیری. معمولی تداوی داوپرایمی کراب خوکه ساحه وړه وی په الکلوباندی درنگونوپه واسطه کیږی. کله چی نوی باغ ږدی باید مقاوم نیالکی کینودل شی.

پرازیتی مچی (Aphelinus mali) افغانستان کی معرفی شولی خوپه وروستنیووختوکی داپرازیت په افغانستان کی نه لیدل کیږی. یوه حشره چی Earwing ورته ویی ددی آفت لوی دښمن ده خوپه افغانستان کی نشته.