Scale Insects: پوبش لرونکی حشرات (چیچـــک):

Brown Scale (*Eulecaniumspp.*) نصواری رنګه چیچک

San Jose Scale (*Quadraspidiotus perniciosus*) سان هوزی چیچک

White Peach *Scale* (*Pseudaulacaspis pentagona*) دشفتالوسپین چیچک

دکاليفورنيا سورچيچک (پوبش لرونکی)

نصواری چیچک (پوبش لرونکی حشره)

دشفتالوسپینه اویادتوت حشره په شفتالوکی. داحشره خانګی تریرغل لاندی راولی اوپانی غورځوی خوپه میوه باندی حمله نکوی داحشره په زردآلو، بادام، ناک، لوبیا، چارمغز، کچالو اونورفصلونه تریرغل لاندی راولی.

سانهوزی پوبش لروونکی چیچک په منوباندی حمله کوی. اوپه میوه سره ګردخالونه پریږدی.

پنبیی بالبنت دوله چیچک حشره دهګیوسپین رنګه خلطی یادداشت کړی

SCALE INSECTS پوښ لرونکی حشرات (چیچک)

توضیحات: ډیری زیاتی میوی دی چی چیچک پری په افغانستان کی حمله کوی لکه نارنجان، خسته لرونکی میوی لکه شفتالو، زردآلو، منې اونوری ځوکلنی چارماغ (مټک) هغه منی چی په میوه سره خالونه دی چی چیچک پری تغذیه کړیوی ددی حشری تاوان ضعیفه کیدل، وده اوحاصل خیزی کمیدل اوڅانګی مری ځینی ددی حشراتوانواع شکرک (شات) هم تولیدوی.

تفتیش اونظارت: سان هوزی شکیل(چیچک) په پخوانی موسم کی تاوان او وګوری که یی تاوان رسولی وه. د استراحت په وخت کی د میوی سل پیخان راټول کړی او په عدسیه باندی ژوندی او پرازیتی شوی حشرات وګوری او په پوښ کی یی سوری وګوری.

تداوی	د Threshhold خساری شروع
له ۲۰ فیصده کم	نه ضرورت نشته
له ۶۰-۲۰ فیصده	د ژمی تیل
له ۶۰ نه زیات	د ژمی تیل+بوپروفیزین buprofezin

نور چیچک: اکثرآ چیچک په پاس قسم باندی نظارت کیږی. یعنی د پخوانی موسم حشرات په تنو کی معاینه کیږی.

په نارنجانو او خسته لرونکو کی که استراحت دوره نوی نو له مخنیوی نه کار اخستل کیږی.

د خزندګانوموجودیت باید د دوبی په لمړیو کی معاینه شی تر څو چه د تداوی مناست وخت پیدا شی د خزندو معاینه د څانګو نه د سکاچ نیپ چه ۱۲ملی متره قطر ولری وکړی چه په ژوندیو ښخینه چیچک اخته شوی وی.

مخنیوی: ددی حشری ډیرطبیعی دښمن موجود ده چه په دی حشراتو کی یوه پرازیتی مچی ده باید وویل شی چه کیمیاوی حشره وژونکی کلورپایروفوس او سایپر مترین له کارولوڅخه ډډه وشی خو دژمی دوا پاشی دومره تاوان نه رسوی.

د سانهوزی چیچک: که یواری په ژمی کی د تیل پاشی وشی او یا د حشری هارمون لکه pyrproxifen یا buprofezinهم ورسره کډ شی ډیره ښه تداوی کیږی.

په نارنجانو کی په کلوروپایروفوس تداوی: کله چه خزنده ګان فعال شی مد نظر ونیول شی. خو pyrproxifen یا buprofezin ته ترجیح ورکړل شی.داوری تیل پاشی دسرطان اواسد په میاشتو کی صورت نیسی.