

# THRIPS -

# تریپس

ONION THRIPS (*Thrips tabaci*), CITRUS THRIPS,  
WESTERN FLOWER THRIPS (*Frankliniella occidentalis*)

د پیازو تریپس  
د لوبیزو کلاکو تریپس



تریپس بچی او بالغه حشره د رنگ تفاوت یادداشت کری



د تریپس د بچیانو تاوان چه د پیازو  
پانو ته یی اړولی دی

د کلاب گل چه ددی حشری له لاسه خراب شوی دی



نارنج چه د تریپس له لاسه متضرره شوی دی



د تریپس تاوان چه د کاهوپه پانو باندی وی



د تریپس بنکاری مایت



**توضحات :** اکثراً تریپس اوردوالی له ۲ ملی متره څخه زیات نوی.رنگ یی له سپین څخه تر ژبره، تیاره نسواری اوتور رنگه دی چه البته نوعی اود ژوند مرحلی پوری اړه لری. یوه نوعه یی ثابت بنکار کوی دا نوعه له د شپرو ټکو په شا باندی بیژندله کیږی. ځینی نوری هم بنکاری دی نو گټه یی د پنبی په گل باندی وی.

دا حشره د ودی په حال گل او یا بوټی باندی تغزیه کوی نو رنگ او شکل ته یی تغیر ورکوی. همدارنگه دا حشره وایرس لیردوی مثلاً په رومی بانجانو کی د مرض سبب گرځی.

کله چه په گلانو کی هکی واچوی نو گل پانوباندی اثر اچوی.بتیتوی مرحله یی په خاورو کی دی.ځوانی حشری په لمړی پسرلی کی راوزی تر څو چه هکی واچوی.ددی حشری څو نسله په اوړی کی پیداگیږی

**تفتیش او نظارت :** کله چه تریپس په کل باندی حمله وکری تاثیر یی کم خو برخلاف په پنبی او غله جاتو کی د زیات تعداد د تداوی وړ نده خو په شفتالو کی باید ددی حشری بالغه اوچنجی باید وکتل شی گلان په یوه سپین کاغز باندی وښوړوی،په نارنجو کی د گل لاندی پانی وگوری. د مبارزی شروع په شفتالو کی ۵فیصده او نارنجو کی ۱۰ فیصده ده همدارنگه د سپور نمونی د ټولولو په وخت کی اوگوری ترڅو چه کال ته تداوی وکرای شی.

په نوش پیازو او اوږه کی کله چه یوه حشره هم ولیدله شی باید دوا پاشی وشی. خو په کلچه یی پیازوکی په تصادفی ډول ۲۰ پیازه معاینه کړی او په لاسی عدسیه باندی پانی او د پیازو طبقی وگوری.دی مبارزی لپاره شروع لپاره ۳۰حشری په کار دی

**مخنیوی :** پرازیټی مچی هکیواوچنجیوباندی حمله کوی.ددی حشری دښمن عبارت ده له سپین رنگه چینجی،انتوکورید خنکی او نباتی مایتونه دی.

هغه حشره وژونکوته چهIPMاجازه ورکوی عبارت دی له سپینوسد،سپینیټورم،ابامکتین اوپایرترین.

نیونیکوتیناید مثلاًامیداکلوپریډ به دی حشری ته مضروی کله چه دوا پاشی شی. پایتراید اوعضوی فاسفتونه اغیزمن دی خو ترIPMلاندی نه سپارښت کیږی.